



Sobreinfección en EPOC

ETIO-PATOGENIA

EPOC: obstrucción crónica y poco reversible del flujo aéreo. Asociado habitualmente al tabaco. Sus exacerbaciones suelen deberse en la mayoría de casos a sobreinfección bacteriana.

SIGNOS / SÍNTOMAS

CLASIFICACIÓN
Basada en FEV₁

-Leve: ≥80%
-Moderada: 50-79%
-Grave: 30-49%
-Muy grave: <30%

CRITERIOS DE DERIVACIÓN HOSPITALARIA

- Descompensación en EPOC grave
- taquipnea (>25 rpm)
- signos de insuf. Cardíaca derecha
- no control posible en domicilio
- disminución nivel de conciencia
- descartar otras patologías: neumonía, neumotórax, TEP, neoplasia, etc.
- Insuficiencia respiratoria
- uso de musculatura accesoria
- Fiebre >38'5°C
- comorbilidad asociada grave
- mala evolución en el seguimiento

CONCLUSIÓN DIAGNÓSTICA

EPOC leve o moderada, con <4 exacerbaciones/año y sin comorbilidad grave

TRATAMIENTO 1

FÁRMACO

DOSIS Y PAUTA

ADULTO
PEDIATRÍA

LEVE

Salbutamol

Ipratropio

2-4 inh/4-6h

2-4 inh/4-6h

MODERADO

Tto de leve + Prednisona

40mg/día
10 días (dosis descendentes)
o 4-5 días (consuspensión brusca)

CON SIGNOS INFECCIÓN BACTERIANA

Amoxiclavulánico

875/8h

TRATAMIENTO 2

FÁRMACO

DOSIS Y PAUTA

ADULTO
PEDIATRÍA

Levofloxacino

500 mg/día 7 días

RECOMENDACIONES

Fisioterapia respiratoria (clapping), hidratación.

Recurso Derivación

Control en 24-48 h por MC

D
H
E
O
R
S
I
P
V
I
A
T
C
A
I
L
Ó
A
N
R
I
A