



Neumonía extrahospitalaria

ETIO-PATOGENIA

Infección pulmonar aguda por diferentes microorganismos (virus, bacterias, hongos, etc).

SIGNOS / SÍNTOMAS

Fiebre, tos con expectoración herrumbrosa, dolor en punta de costado, hipofonesis localizada, crepitantes, aumento del frémito vocal, matidez a la percusión.

CONCLUSIÓN DIAGNÓSTICA

Neumonía típica

Neumonía atípica

- 1. ≥ 2 criterios CRB-65:
 - confusión
 - frecuencia respiratoria ≥ 30
 - PAS < 90 o PAD < 60
 - edad ≥ 65 ;
- 2. Sospecha de neumonía por aspiración;
- 3. Comorbilidad importante: cardiopatías, cirrosis, neumatías, alcoholismo, nefropatías, inmunosupresión;

TRATAMIENTO 1

FÁRMACO
DOSIS Y PAUTA

ADULTO
PEDIATRÍA

Amoxi-clavulánico

Levofloxacino

875-125/8h 10 días

500mg/día 10 días

TRATAMIENTO 2

FÁRMACO
DOSIS Y PAUTA

ADULTO
PEDIATRÍA

Levofloxacino

Azitromicina


500 mg/día 10 días

500 mg/día 6 días;
10 mg/kg/día 1 toma * 3 días

RECOMENDACIONES

¡¡ Revalorar al paciente en 24 horas !!

Recurso Derivación



Derivación hospitalaria